

Una guía breve para manejar el nivel muy bajo de azúcar en sangre.¹



Esté atento a uno o más de estos primeros síntomas de niveles bajos de azúcar en sangre:²

- Temblequeo
- Mareos
- Visión borrosa
- Conducta agresiva
- Problemas para responder preguntas básicas

Si no se trata, un nivel muy bajo de azúcar en sangre puede provocar confusión, convulsiones, pérdida del conocimiento o la muerte.²

La jeringa precargada (Pre-Filled Syringe, PFS) Gvoke[®] puede usarse en cualquiera de los siguientes casos:²



Ha tratado de corregir la situación con alimentos y bebidas, pero no hay mejoría.



No puede tragar de forma segura.



Siente como que se desmaya.



Se desmaya o tiene una convulsión.

Gvoke PFS se usa para tratar los niveles muy bajos de azúcar en sangre en adultos y niños de 2 años de edad o más.¹


Consulte la [información de seguridad importante](#).

Cualquier persona puede usar Gvoke PFS para aumentar el azúcar en sangre a niveles seguros en tan solo 2 pasos.¹⁻³
Incluso usted puede autoadministrarse Gvoke PFS en ciertas situaciones.²

1

Prepare

Quite el tapón de la jeringa.



2

inyecte

Pellizca la piel e inserte la aguja en un ángulo de 90 grados. Presione el émbolo hacia abajo, hasta donde llegue.



Administre en la parte superior del brazo, el estómago o el muslo.

Si la persona se desmayó o está convulsionando después de usar Gvoke PFS, colóquela de costado. Llame a emergencias para pedir ayuda.²

Consulte las Instrucciones de uso de Gvoke PFS para obtener instrucciones detalladas completas en GvokeGlucagon.com.

Muéstreles a quienes lo rodean cómo usar Gvoke PFS antes de que ocurra una emergencia. Es posible que deban administrarlo si tiene un evento grave de hipoglucemia.²

Anote dónde guardará su Gvoke PFS para que quienes lo rodean sepan dónde encontrarlo.

Almacénelo a temperatura ambiente. No lo refrigere.¹

Indicación e información de seguridad importante

GVOKE es un medicamento recetado que se usa para tratar los niveles muy bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia grave) en adultos y niños de 2 años o más con diabetes. Se desconoce si GVOKE es seguro y eficaz en niños menores de 2 años.

ADVERTENCIAS

No use GVOKE si:

- Tiene un tumor en la glándula que se encuentra en la parte superior de los riñones (glándula suprarrenal), denominado feocromocitoma.
- Tiene un tumor en el páncreas, denominado insulinooma o glucagonoma.
- Es alérgico al glucagón o a cualquier otro ingrediente inactivo de GVOKE.

GVOKE PUEDE PROVOCAR EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES, QUE INCLUYEN:

Hipertensión arterial. GVOKE puede causar hipertensión arterial en ciertas personas con tumores en las glándulas suprarrenales.

Nivel bajo de azúcar en sangre. GVOKE puede producir hipoglucemia en ciertas personas con tumores en el páncreas.

Erupción cutánea grave. GVOKE puede causar una erupción cutánea grave en ciertas personas con un tumor en el páncreas denominado glucagonoma.

Reacción alérgica grave. Llame a su médico o **busque ayuda médica de inmediato** si tiene una reacción alérgica grave que incluya:

- erupción
- dificultad para respirar
- hipotensión arterial

EFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTES

Los efectos secundarios más frecuentes de GVOKE incluyen los siguientes:

- náuseas
- vómitos
- hinchazón en el lugar de la inyección
- dolor de cabeza

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de GVOKE. Para obtener más información, consulte a su médico.

Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios.
Se le recomienda informar los efectos secundarios de fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA).
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

ANTES DE USAR

Antes de usar GVOKE, informe a su médico acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene un tumor en el páncreas.
- No ha recibido alimentos ni agua durante un largo tiempo (ayuno prolongado o inanición nutricional).

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

CÓMO USARLO

- Lea las Instrucciones de uso detalladas que se adjuntan al medicamento GVOKE.
- Asegúrese de que su cuidador sepa dónde guarda GVOKE y cómo usarlo de manera correcta antes de que usted necesite su ayuda.
- Su médico le dirá cómo y cuándo usar GVOKE.
- GVOKE contiene solamente 1 dosis del medicamento y no se puede volver a usar.
- Después de administrar GVOKE, el cuidador debe llamar para obtener ayuda médica de emergencia de inmediato.
- Si la persona no responde luego de 15 minutos, se puede administrar otra dosis.
- Informe a su médico cada vez que use GVOKE.
- Almacene GVOKE a una temperatura comprendida entre 68 °F y 77 °F. No lo guarde en el refrigerador ni lo congele.
- Mantenga GVOKE en la bolsa de aluminio hasta que esté listo para usarlo.

Mantenga GVOKE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Para obtener más información, llame al 1-877-937-4737 o visite www.GvokeGlucagon.com.

Consulte la información de prescripción completa para GVOKE PFS.

[GvokeGlucagon.com](http://www.GvokeGlucagon.com)

Referencias: 1. Gvoke [información de prescripción]. Chicago, IL: Xeris Pharmaceuticals, Inc; 2019. 2. Jeringa precargada de Gvoke [instrucciones de uso]. Chicago, IL: Xeris Pharmaceuticals, Inc; 2019. 3. Newswanger B, Prestrelski S, Andre AD. Human factors studies of a prefilled syringe with stable liquid glucagon in a simulated severe hypoglycemia rescue situation. *Expert Opin Drug Deliv.* 2019;16(9):1015-1025.

Gvoke®, Gvoke® PFS, Xeris Pharmaceuticals® y sus logotipos asociados son marcas comerciales de Xeris Pharmaceuticals, Inc. Todas las demás marcas comerciales a las que se hace referencia en el presente pertenecen a sus respectivos dueños.
Copyright ©2020 Xeris Pharmaceuticals, Inc.

Todos los derechos reservados. US-GVKPFS-20-00126 10/20

